

## Signalizačná správa ÚKSÚP

Dnes začneme **kučeravosťou broskyňových listov**, obávanou chorobou broskyň. Pri jej silnom výskyte môže dôjsť až k úplnému výpadku úrody, pri opakovaných viac rokov po sebe nasledujúcich výskytoch aj k odumretiu celých stromov. Pre šírenie tejto choroby je potrebné vlhké a daždivé počasie a nižšie teploty okolo 10°C. **Najdôležitejšie sú dažde v období pučania priamo do rozvíjajúcich sa púčikov**, vlhkosť alebo sucho dlho pred pučaním nemá väčší vplyv na výskyt tejto choroby. Počasie na jar je vždy veľmi premenlivé a je takmer isté, že dážď do pučiacich broskyň bude. Najúčinnnejšou ochranou proti kučeravosti je správne načasovaný postrek, a to **v období nalievania sa púčikov**. Je to veľmi krátky čas, ktorý je pre dobrú účinnosť rozhodujúci. Aj z tohto dôvodu **je potrebné veľmi presne sledovať túto fenofázu a ošetrovať presne v správnom čase!** Neošetruje sa iba v období, keď sa očakávajú mrazy, ktoré uplynulý víkend boli aj v nižších polohách. Nie je však vylúčený ich návrat, preto v prípade ošetrenia odporúčame opakovaný postrek po ďalšej prípadnej vlne mrazov.

Vysokú účinnosť vykazujú najmä mednaté prípravky Airone SC, Badge WG, Coprantol Duo, Cuproxat SC (aj v malospotrebiteľskom balení – „MB“), Champion 50 WG (aj MB) alebo Kuprikol 50 (aj MB), a iba v malospotrebiteľskom balení Kučeravosť Stop, pri ktorých pri správnom ošetrení možno dosiahnuť jedným postrekom uspokojivé výsledky. Iba pri pokračujúcom vlhkom a chladnom počasí, ktoré predlžuje pučanie a tým aj možnosť infekcie, a najmä v prípade dažďa priamo do pučiacich púčikov, odporúčame ešte jeden postrek, ale už inými fungicídmi (v žiadnom prípade nie mednatými, ktoré spôsobia spálenie lístkov!), ako sú s účinnou látkou dithianon prípravky Alcoban, Delan 700 WDG, Dion 700 WG, Dynamo a Thianon 700 WDG, s účinnou látkou mancozeb prípravok Dithane M 45 alebo s účinnou látkou dodine prípravky Syllit 400 SC, Syllit 544 SC a iba v malospotrebiteľskom balení Syllit 65. Tieto prípravky možno použiť aj pri pučaní. Druhé ošetrenie treba vykonať 7-14 dní po prvom ošetrení najneskôr do začiatku kvitnutia stromov. Ošetrenie po kvitnutí sa už neodporúča, nakoľko má veľmi nízky účinok. Množstvo postrekovej tekutiny by malo byť vyššie, a to 1 000 litrov na ha. Po kvitnutí je potrebné poškodené listy mechanicky odstrániť.

Už teraz upozorňujeme na **moniliózu kvetov a výhonkov kôstkovín**, ktorá napáda najmä marhule, v menšej miere aj čerešne a višne. Kvitnutie marhúľ možno predpokladať najskôr približne o 10 dní. Chorobe vyhovuje vlhké počasie, najnebezpečnejší je dážď priamo do rozvinutých alebo odkvitajúcich kvetov. Preventívnou ochranou je dôkladné odstraňovanie napadnutých plodov počas ich dozrievania, ale najmä po zbere. Suché plody z vlaňajšej úrody **treba odstrániť rezom konárikov až po zdravé drevo**. Chemická ochrana kvetov a výhonkov sa zvyčajne vykonáva 2-krát, a to na začiatku kvitnutia a na konci kvitnutia. **Ošetrenie sa odporúča iba na náchylných odrodách a za daždivého počasia, najmä v období kvitnutia**. Preto je veľmi dôležité sledovať začiatok kvitnutia. Z prípravkov sú na ošetrenie sliviek, čerešní a višní povolené Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Rys a Tebu 250, ďalej na broskyne, marhule, slivky a čerešne Prolectus (aj MB), na čerešne Switch 62,5 WG a do všetkých kôstkovín Airone SC, Badge WG, Coprantol Duo, Luna Experience, Signum (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Zato 50 WG a biologický prípravok Serenade Aso. Množstvo postrekovej tekutiny by malo byť vyššie, a to 1 000 litrov na hektár.